1 次の計算をしなさい。

(1) $1 - (-3) \times 2$ (2) $\frac{1}{2} - \frac{1}{5}$

(3) $\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{27}$ (4) $(x^2 - 3x + 5) - (x + 2)$

(5) $(-5a)^2$ (6) $2ab \times 3b^2$

【出題のねらい】
 (1) 正負の数, (2) 分数, (3) 根号の四則演算の
 きまりが理解できる。
 (4) 多項式の加減ができる。
 (5)~(6) 指数法則が理解できる。

(1) $1 - (-3) \times 2 = 1 + 6 = 7$

(2) $\frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{5}{10} - \frac{2}{10} = \frac{3}{10}$

(3) $\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{27} = \sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

(4) $(x^2 - 3x + 5) - (x + 2) = x^2 - 3x + 5 - x - 2 = x^2 - 4x + 3$

(5) $(-5a)^2 = (-5)^2 a^2 = 25a^2$

(6) $2ab \times 3b^2 = 2 \times 3 ab^{1+2} = 6ab^3$

2 次の□をうめなさい。

(1) ある数xに7を加えてから3倍するということが式で表すと□となる。

(2) 関数 $y = x^2 + 3x + 1$ において $x = 1$ のときのyの値は□である。

(3) 無理数 $\frac{2}{\sqrt{5}}$ の分母を有理化すると□である。

(4) 無理数 $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$ の分母を有理化すると□である。

(5) 整式 $(x-2)(x+4)$ を展開すると□である。

(6) 整式 $x^2 - 9$ を因数分解すると□となる。

(7) 整式 $x^2 - 8x + 16$ を因数分解すると□となる。

(8) 整式 $2x^2 + 7x - 4$ を因数分解すると□となる。

【出題のねらい】
 (1) 括弧の有用性を認識し, 表現することができる。
 (2) 数値を代入して計算できる。
 (3)~(4) 分母の有理化ができる。
 (5) 展開の公式を利用できる。
 (6)~(8) 因数分解の公式を利用できる。

(3) $\frac{2}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

(4) $\frac{1 \times (\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3}^2 - 1^2} = \frac{\sqrt{3} + 1}{3 - 1} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

(5) $(x-2)(x+4) = x^2 + (-2+4)x + (-2) \cdot 4 = x^2 + 2x - 8$

(6) $x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x+3)(x-3)$

(7) $x^2 - 8x + 16 = x^2 - 2 \times 4x + 4^2 = (x-4)^2$

(8) $2x^2 + 7x - 4 = (2x-1)(x+4)$

3 次の方程式, 不等式を解きなさい。

(1) $3x - 1 = 14$ (2) $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$ (3) $(x-1)(x+3) = 0$

(4) $x^2 - 5x + 3 = 0$ (5) $2x - 7 < 1$ (6) $3x + 4 < 8x - 6$

【出題のねらい】
 (1) 1次方程式を解くことができる。
 (2) 2元1次の連立方程式を解くことができる。
 (3) 因数分解された式から解を出すことができる。
 (4) 解の公式を利用して解くことができる。
 (5)~(6) 1次不等式を解くことができる。

(1) $3x - 1 = 14$ (2) $x + 2y = 7$ (3) $(x-1)(x+3) = 0$ なので,

$3x = 15$ $-) \quad x - y = 1$ $\therefore y = 2$ $x - 1 = 0$ または $x + 3 = 0$

$\therefore x = 5$ $\underline{\hspace{1cm}} \quad 3y = 6$ $x = 3$ $\therefore x = 1, -3$

(4) $x^2 - 5x + 3 = 0$ 解の公式より $x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}$

(5) $2x - 7 < 1$ 1を移項して, $2x < 7 + 1 = 8$ 両辺を2で割る. $\therefore x < 4$

(6) $3x + 4 < 8x - 6$ 移項して, $4 + 6 < 8x - 3x$ $\therefore 10 < 5x$ 両辺を5で割る. $2 < x$
 $\therefore x > 2$

【選択問題】; 2次関数

2次関数 次の各問に答えなさい。

4 (1) 関数 $f(x) = x^2 - 4x + 7$ について $f(2)$ の値を求めなさい。

(2) 2次関数 $y = x^2 - 4x + 7$ を $y = (x-p)^2 + q$ の形に直しなさい。

5 2次関数 $y = (x-2)^2 - 1$ のグラフについて, 軸と頂点を求めなさい。

6 2次関数 $y = (x-1)^2 - 3$ のグラフを参考にして定義域 $0 \leq x \leq 3$ における最大値・最小値を求めなさい。

【出題のねらい】
 4 (1) 関数の記号に慣れ, 代入することができる。
 (2) 2次関数の式を標準変形することができる。
 5 標準変形された式から軸と頂点を読み取ることができる。
 6 定義域が与えられたときの最大・最小を理解できる。

4 (1) $f(2) = 2^2 - 4 \times 2 + 7 = 3$

(2) $y = x^2 - 4x + 7 = (x^2 - 4x + 4) - 4 + 7 = (x-2)^2 + 3$

5 $y = (x-p)^2 + q$ のとき, $= (x-2)^2 + 3$

軸は直線 $x = p$, 頂点は点 (p, q) なので, 軸は直線 $x = 2$, 頂点は点 $(2, -1)$ となる。

6 グラフより最大値 $1(x=3$ のとき), 最小値 $-3(x=1$ のとき)

【選択問題】; 三角比

三角比 次の各問に答えなさい。

4 右図の直角三角形ABCにおける辺ACの長さを求めなさい。

5 次の式の値を求めなさい。

(1) $\sin 30^\circ - \cos 60^\circ$ (2) $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ$

6 $\angle A$ は鋭角で, $\cos A = \frac{4}{5}$ のとき, 次の値を求めなさい。

(1) $\sin A$ (2) $\tan A$

【出題のねらい】
 4 (1) 三平方の定理を利用して辺の長さを求めることができる。
 5 (1) 特別な角の三角比を利用して計算することができる。
 (2) 相互関係の公式を理解し, 活用できる。
 6 作図, または相互関係の公式を利用して三角比を求めることができる。

4 三平方の定理より $2^2 = 1^2 + AC^2$ よって, $AC^2 = 4 - 1 = 3$, $AC > 0$ なので, $AC = \sqrt{3}$

5 (1) $\sin 30^\circ - \cos 60^\circ = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ (2) 三角比の相互関係より $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ = 1$

6 (1)~(2) 右図において, 三平方の定理より $BC = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3$

よって図より, $\sin A = \frac{3}{5}$, $\tan A = \frac{3}{4}$

<別解> $\angle A$ が鋭角なので, $\sin A \geq 0$, $\tan A \geq 0$.
 三角比の相互関係より,

$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$, $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{5 \sin A}{5 \cos A} = \frac{3}{4}$